



Nevo di Spitz atipico ?

Master di Dermatologia Pediatrica, Università G.Marconi, Roma
Direttori: F.Arcangeli, T.Lotti

Puddu Giovanni


Alario D., Amadori A., Arcese G., Ciulli L., D'Andrea GB., Depino R., Farina M., Fiammenghi E., Franch A., Iannone A., Ibba F., Larrone M.F., Licordari A., Lucente D., Magliani F., Manta M., Milioni M., Simone F., Arcangeli F.

Una ragazzina di 14 anni, di fototipo chiaro, frequentemente esposta al sole perché pratica tennis a livello agonistico, si presenta alla nostra osservazione per la comparsa – da circa un anno secondo la madre, da tre secondo il padre – di una lesione parzialmente pigmentata maculo-papulare della superficie esterna del polpaccio sinistro. Nessun sintomo soggettivo associato, riferito lento ma progressivo accrescimento.



L'esame dermoscopico evidenzia:

1. Asimmetria e disordine architetturale
2. Un'area iperpigmentata di colore bruno scuro, disomogenea, non strutturata con punti bruno-nerastri di diverse dimensioni nella parte superiore destra
3. Un'area grigiastra nella zona centrale
4. Un'area globulare su sfondo chiaro, con pattern suggestivo per nevo di Spitz, nella zona inferiore, con tonalità cromatica degradante dal bruno chiaro al roseo e al quasi bianco



Nevo di Spitz o Melanoma spitzoide ?

L'aspetto dermoscopico, non proprio tranquillizzante, l'età adolescenziale della paziente, l'incertezza circa l'epoca di comparsa e quindi il periodo di accrescimento della lesione ci hanno indotto a proporre l'exeresi chirurgica diagnostica.

Referto Istologico

"Nevo nevocitico composto, costituito da cellule fusate ed epitelioidi, con pigmento melanico intracitoplasmatico, a tipo nevo di Reed. Nevo di Spitz-Reed senza atipie istologiche."

Bibliografia

1. Soura E, Plaka M, Stefanaki C, Chasapi V, Christofidou E, Antoniou C, Stratigos A. «Characteristics of Spitz nevi. Atypical Spitz nevi and Melanomas in patients younger than 20 years» J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017
2. Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, Lazaridou E, Kyrgidi A, Broganelli P, Alfano R, Zalaudek I, Argenziano G; International Dermoscopy Society.. «Update of dermoscopy of Spitz/Reed naevi and management guidelines by the International Dermoscopy Society» Br J Dermatol. 2017
3. Dika E, Ravaoli GM, Fanti PA, Neri I, Patrizi A. «Spitz nevi and Other Spitzoid Neoplasms in Children: Overview of Incidence, Data and Diagnostic Criteria» Pediatr Dermatol. 2017