

UN HERPES SIMPLEX IN TRE ATTI

Master di Dermatologia Pediatrica, Università G.Marconi, Roma
 Direttori: F.Arcangeli, T.Lotti

Franch Annalisa

Alario D., Amadori A., Arcese G., Ciulli L., D'Andrea GB., Depino R., Farina M., Fiammenghi E., Iannone A., Ibba F., Larrone M.F., Licordari A., Lucente D., Magliani F., Manta M., Milioni M., Puddu G. Simone F.

Nicolo', 11 anni, è un ragazzo sano, molto sportivo, che soffre di herpes labiale ricorrente.

Gli capita ogni volta che sta troppo al sole o quando si affatica molto.

Gli arriva puntuale anche mentre è al mare, in barca a vela, ma poiché la vacanza dura solo 1 settimana, l'herpes viene ignorato e Nicolo' sta al sole, nuota e si tuffa dalla mattina alla sera.



Giunge in visita al rientro dalla breve vacanza. Presenta una grossa **lesione** al labbro inferiore, in parte **necrotico-emorragica**.

Il labbro superiore e la mucosa orale sono indenni.

Presenta inoltre una eruzione vescicolare su cute eritematosa alla superficie mediale anteriore di entrambe le cosce, insorta circa due giorni prima e asintomatica. Una chiazza con le stesse caratteristiche è presente anche al dorso, in regione scapolare destra. Non ha febbre e le condizioni generali sono buone.



Dopo visita dermatologica viene posta diagnosi di **eczema erpeticato** e prescritta terapia sistemica con aciclovir e topica con antibiotico e cortisonico.



Dopo due giorni compaiono altre lesioni vescicolari, isolate e multiple, al padiglione auricolare, al dorso e al palmo delle mani. Sono interessati anche il labbro superiore e in minima parte la cavità orale.



Il caratteristico aspetto a bersaglio, con scollamento centrale, di alcune lesioni, permette di proporre la diagnosi di **eritema polimorfo**.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Continuare ad esporsi al sole nonostante la presenza dell'herpes labiale, potrebbe aver comportato l'ingrandimento e l'evoluzione necrotico-emorragica della lesione.
2. L'eczema erpeticato potrebbe, in condizioni particolari, come in questo caso, essersi presentato anche in occasione di una recidiva erpetica, forse a causa dell'ustione cutanea da sole.
3. L'eritema polimorfo infine, nella sua forma minore, con interessamento del volto, tipicamente del palmo delle mani e modesto coinvolgimento mucoso, è una caratteristica eruzione post-infettiva, in particolare post-herpetica.

BIBLIOGRAFIA

- Lehman JS, el-Azhary RA. Kaposi varicelliform eruption in patients with autoimmune bullous dermatoses. *Int J Dermatol.* 2016 Mar. 55 (3):e136-40
- Kaposi Varicelliform Eruption. Medscape eMedicine. <https://emedicine.medscape.com/article/1132622>
- Sokumbi O, Wetter DA. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. *Int J Dermatol.* 2012 Aug. 51(8):889-902

